Zobrazte tento e-mail ve svém prohlížeči

PODPŮRNÁ LÉČBA V ONKOLOGII

září 2022 | číslo 7 | Odborná doporučení ESMO: Léčba anémie a nedostatku železa u onkologických pacientů*

Zpravodaj

věnovaný aktuálním tématům z oblasti podpůrné léčby onkologických pacientů

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

tento první zářijový zpravodaj věnujeme tématu léčby anémie a nedostatku železa u pacientů se solidními nádory nebo hematologickými malignitami. Anémie a nedostatek železa (ID) jsou častými komplikacemi těchto pacientů, zejména u pacientů léčených chemoterapeutiky. Celkově v současné době neexistují žádné klinické důkazy (jednotlivé studie či metaanalýzy), které by naznačovaly negativní vliv látek stimulujících erytropoézu (ESA) na stimulaci progrese onemocnění nebo jeho relapsu, pokud jsou používány v souladu s odbornými postupy a v rámci schváleného dávkování a způsobu podání. Odborné doporučené postupy ESMO poskytují odpovědi na otázky pro hodnocení anémie a zahrnují doporučení, jak bezpečně zvládat anémii vyvolanou chemoterapií pomocí látek stimulujících erytropoézu (ESA), přípravků železa pro intravenózní, nebo orální podání, transfúze červených krvinek a kombinace těchto léčebných postupů.

Věříme, že tyto informace budou přínosem pro Vaši odbornou praxi.

Váš Teva tým



Léčba anémie pomocí ESA by měla být zvážena u pacientů s chemoterapií po vyrovnání nedostatku železa a odstranění dalších jiných základních příčin, než je onkologické onemocnění nebo jeho léčba. Terapie ESA se doporučuje u pacientů se symptomatickou anémií, kteří dostávají chemoterapii nebo kombinovanou chemoradioterapii a mají hladinu Hb < 100 g/l, stejně jako u pacientů s asymptomatickou anémií, kteří dostávají chemoterapii a mají hladinu Hb < 80 g/l.

Jaké je cílové rozmezí Hb pro léčbu pomocí ESA? V jakých dávkách by měly být podávány ESA? Kteří pacienti by měli dostávat léčbu železem? Na tyto a další otázky naleznete odpovědi v odborných postupech ESMO.

Více zde



Na základě zjištění ze studií na neonkologické populaci a pacientech s onkologickým onemocněním podstupujících chirurgický zákrok se doporučuje, aby transfúze červených krvinek byly vyhrazeny pro pacienty s hladinami Hb pod 70 g/l – 80 g/l a pro situace, kdy je nutné rychlé zlepšení závažné symptomatické anémie. Terapie ESA se doporučuje u pacientů se symptomatickou anémií, kteří dostávají chemoterapii nebo kombinovanou chemoradioterapii a mají hladinu Hb < 100 g/dl, stejně jako u pacientů s asymptomatickou anémií, kteří dostávají chemoterapii a mají hladinu Hb < 80 g/dl. Léčebné schéma chemoterapií indukované anémie u pacientů se solidními nebo hematologickými malignitami naleznete ZDE.

* Aapro M, Beguin Y, Bokemeyer C. et al. on behalf of the ESMO Guidelines Committee. Management of anaemia and iron deficiency in patients with cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines, Annals of Oncology 29 (Supplement 4): iv96–iv110, 2018

Eporatio®

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před podáním přípravku prostudujte pečlivě úplné znění Souhrnné informace o přípravku ZDE.

Více zde

webová verze emailu

Pro odhlášení zpravodaje a vymazání registračních údajů klikněte ZDE. I Copyright ©2022 teva.cz I ONC-CZ-00039